


QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19?

Comme pour tout vaccin, certaines personnes éprouveront des effets secondaires légers après avoir été vaccinées contre la Covid-19. C'est un signe que le corps développe une protection. Les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 comprennent;

- de la fièvre
- de la fatigue
- des maux de tête
- des douleurs musculaires
- des frissons
- de la diarrhée et de la douleur ou des rougeurs au site d'injection.



Tout le monde ne ressentira pas d'effets secondaires. La plupart des effets secondaires disparaissent en quelques jours d'eux-mêmes.

Vous pouvez gérer tous les effets secondaires avec du repos, beaucoup de liquides non alcoolisés et en prenant des médicaments pour gérer la douleur et la fièvre, si nécessaire.

- Si;
- vous craignez que les effets secondaires que vous ressentez soient inhabituels
 - si la douleur dans le bras où vous avez reçu l'injection s'aggrave après 24 heures
 - ou si vos effets secondaires ne disparaissent pas en quelques jours, contactez votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils.

Des effets secondaires plus graves ou de longue durée des vaccins contre la Covid-19 sont possibles, mais extrêmement rares. Les vaccins font l'objet d'une surveillance continue aussi

- PUIS-JE ME FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 SI JE SUIS ENCEINTE?

Oui, vous pouvez vous faire vacciner si vous êtes enceinte. Pendant la grossesse, vous courez un risque plus élevé de maladie grave causée par la Covid-19. Vous courez également un risque plus élevé d'accoucher prématurément si vous contractez la Covid-19.

- DEVRAIS-JE ME FAIRE VACCINER SI JE VEUX AVOIR UN BÉBÉ À L'AVENIR?

Oui, vous devriez vous faire vacciner si vous prévoyez de tomber enceinte

Il n'existe actuellement aucune preuve suggérant que les vaccins contre la Covid-19 interfèrent avec la fertilité ou causent des problèmes aux organes reproducteurs. Se faire vacciner est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous protéger et protéger la santé future de votre bébé.

- DEVRAIS-JE ME FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 SI J'ALLAITE?

Oui, aucun des vaccins Covid-19 actuels ne contient de virus vivant

Il n'y a aucun risque que vous transmettiez le Covid-19 à votre bébé par le biais de votre lait maternel



INFORMATIONS SUR LA VACCINATION COVID-19 POUR LES PATIENTS

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS

+254 724 301 755

www.epnetwork.org | info@epnetwork.org

Maisonette 1, Kirichwa Flats, LR No. 2/68,
Kirichwa Road, Kilimani, Nairobi, Kenya



COMMENT FONCTIONNENT LES VACCINS?

Les vaccins apprennent à notre système immunitaire à reconnaître le virus. Après avoir été vaccinés, notre système immunitaire reconnaît, attaque et bloque le virus.



QUELS SONT LES AVANTAGES DE SE FAIRE VACCINER?

- Se faire vacciner pourrait vous sauver la vie. Les vaccins contre la Covid-19 offrent une protection solide contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès.
- Même après vous être fait vacciner, continuez à prendre des précautions pour vous protéger, protéger votre famille, vos amis et toute autre personne avec qui vous pourriez entrer en contact
- Les vaccins contre le Covid-19 sont efficaces, mais certaines personnes contracteront encore le Covid-19 après la vaccination.

QUI DEVRAIT SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19?

Les vaccins contre la Covid-19 autorisés par l'OMS sont sans danger pour la plupart des personnes âgées de 12 ans et plus, y compris celles qui souffrent de maladies préexistantes. Ces conditions comprennent;

- l'hypertension
- le diabète
- l'asthme
- les maladies pulmonaires, hépatiques et rénales,
- ainsi que les infections chroniques stables

Le vaccin de Pfizer peut être administré en toute sécurité aux enfants partir de 5 ans. Les vaccins De Moderna et de Pfizer sont homologués pour une utilisation chez les enfants à partir de 12 ans.



QUI NE DEVRAIT PAS ÊTRE VACCINÉ CONTRE LA COVID-19?

Vus ne devriez PAS être vacciné si:

- Vous avez des antécédents de réactions allergiques graves à l'un des ingrédients du vaccin Covid-19
- Vous avez une fièvre supérieure à 38,5°C le jour de votre vaccinal. Reportez jusqu'à ce que vous ayez récupéré.
- You currently have or are suspected of Covid-19. Wait until you have completely recovered to get vaccinated

Les vaccins contre la Covid-19 sont sans danger pour les personnes qui prennent des anticoagulants, mais vous devez informer la personne qui vous donne le vaccin de vous faire vacciner.